

Tiếp - Bài trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 - Chăm sóc hậu phẫu bệnh nhân phẫu thuật mắt

Câu 1 Mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chăm sóc hậu phẫu bệnh nhân phẫu thuật mắt là gì?

- A. Đảm bảo an toàn hô hấp và tuần hoàn
- B. Giảm đau tối đa
- C. Phòng ngừa nhiễm trùng
- D. Hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc mắt

Câu 2 Đặc điểm nào sau đây là đặc thù của phẫu thuật mắt so với phẫu thuật lớn ở ổ bụng?

- A. Gây biến động lớn về huyết động
- B. Mất máu nhiều
- C. Vùng phẫu thuật nhỏ, tinh vi, yêu cầu bất động tuyệt đối
- D. Thời gian phẫu thuật thường kéo dài

Câu 3 Phương pháp vô cảm nào thường được sử dụng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể và glaucoma?

- A. Gây mê toàn thân
- B. Gây tê tại chỗ kết hợp an thần nhẹ
- C. Gây tê tủy sống
- D. Gây tê đám rối thần kinh cánh tay

Câu 4 Tại sao cần kiểm soát tốt buồn nôn và nôn ói sau mổ (PONV) ở bệnh nhân phẫu thuật mắt?

- A. Vì nôn ói làm tăng nhãn áp đột ngột, có thể gây xuất huyết nội nhãn hoặc bung vết mổ
- B. Vì nôn ói gây mất nước
- C. Vì nôn ói làm bệnh nhân đau đầu
- D. Vì nôn ói gây tăng huyết áp

Câu 5 Biến chứng nào sau đây là nghiêm trọng nhất có thể xảy ra do gây tê cạnh nhãn cầu?

- A. Tụ máu sau nhãn cầu
- B. Viêm nội nhãn
- C. Tăng nhãn áp
- D. Phản xạ mắt-tim

Câu 6 Phản xạ mắt-tim (OCR) thường gặp nhất trong loại phẫu thuật mắt nào?

- A. Phẫu thuật đục thủy tinh thể
- B. Phẫu thuật glaucoma
- C. Phẫu thuật lác mắt
- D. Phẫu thuật dịch kính võng mạc

Câu 7 Thuốc nào sau đây được biết là có thể làm tăng nhãn áp và nên tránh ở bệnh nhân chấn thương mắt mở?

- A. Propofol
- B. Succinylcholine
- C. Rocuronium
- D. Fentanyl

Câu 8 Trong phẫu thuật dịch kính võng mạc có bơm khí nội nhãn, cần tránh sử dụng khí nào sau đây?

A. Oxy

B. Nitơ

C. N₂O

D. CO₂

Câu 9 Tư thế nằm ngửa là tư thế tiêu chuẩn trong phẫu thuật mắt vì lý do chính nào?

A. Giúp phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê tiếp cận bệnh nhân thuận lợi

B. Giảm nguy cơ trào ngược dạ dày

C. Tăng dung tích phổi

D. Giảm áp lực nội sọ

Câu 10 Khi đặt tư thế nằm ngửa cho bệnh nhân phẫu thuật mắt, cần lưu ý điều gì để tránh chèn ép dây thần kinh ngoại biên?

A. Đặt tay dạng < 90 độ hoặc khép, ngửa bàn tay hoặc tư thế trung tính

B. Đặt tay dạng > 90 độ

C. Gập cổ quá mức

D. Đặt đầu cao hơn chân

Câu 11 Tư thế Trendelenburg trong phẫu thuật mắt có đặc điểm nào sau đây?

A. Đầu cao hơn chân 10-20°

B. Đầu thấp hơn chân 10-20°

C. Bệnh nhân nằm sấp

D. Bệnh nhân nằm nghiêng

Câu 12 Ảnh hưởng hô hấp nào sau đây có thể gặp khi đặt bệnh nhân ở tư thế Trendelenburg?

- A. Cơ hoành bị đẩy lên, giảm dung tích phổi
- B. Tăng dung tích phổi
- C. Giảm áp lực nội sọ
- D. Tăng lưu lượng máu não

Câu 13 Trong phẫu thuật mắt, tư thế thẳng đứng có thể hữu ích trong trường hợp nào sau đây?

- A. Loại bỏ dị vật tiền phòng
- B. Điều chỉnh bong võng mạc bằng bong bóng khí
- C. Phẫu thuật glaucoma
- D. Phẫu thuật lác mắt

Câu 14 Biện pháp nào sau đây giúp phòng ngừa ứ đọng CO₂ dưới màn phẫu thuật trong phẫu thuật mắt?

- A. Nâng cao màn phẫu thuật cách xa mặt
- B. Đặt bệnh nhân ở tư thế Trendelenburg
- C. Tăng liều thuốc an thần
- D. Sử dụng mask thanh quản

Câu 15 Đối với bệnh nhân không đặt nội khí quản, biện pháp nào sau đây giúp phòng ngừa tụt lưỡi và giảm thông khí?

- A. Đặt canule Guedel
- B. Đặt nội khí quản
- C. Thở oxy qua mũi
- D. Tư thế Trendelenburg

Câu 16 Trong gây mê cho phẫu thuật mắt, việc sử dụng mask thanh quản (LMA) thay cho ống nội khí quản có lợi ích gì?

- A. Giảm phản xạ ho lúc tỉnh, hạn chế tăng nhãn áp đột ngột
- B. Tăng thông khí
- C. Giảm nguy cơ viêm nội nhãn
- D. Rút ngắn thời gian phẫu thuật

Câu 17 Yếu tố nguy cơ nào sau đây làm tăng tỷ lệ PONV ở trẻ em phẫu thuật lác mắt?

- A. Gây mê bằng thuốc mê bay hơi
- B. Sử dụng opioid liều cao
- C. Tiền sử say tàu xe
- D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 18 Thuốc chống nôn nào sau đây có thể gây cơn glaucoma góc đóng cấp và không nên dùng cho bệnh nhân lớn tuổi có tiền sử glaucoma?

- A. Ondansetron
- B. Dexamethasone
- C. Scopolamine
- D. Droperidol

Câu 19 Trong phẫu thuật glaucoma, biến chứng nào có thể xảy ra nếu nhãn áp tụt thấp quá mức sau mổ?

- A. Xuất huyết hắc mạc
- B. Viêm nội nhãn
- C. Tăng nhãn áp
- D. Phản xạ mắt-tim

Câu 20 Sau phẫu thuật Phaco, bệnh nhân thường được băng mắt trong thời gian bao lâu?

A. Ít nhất vài giờ đến qua đêm đầu tiên

B. 1 tuần

C. 1 tháng

D. Không cần băng

Muốn tự tạo bài trắc nghiệm như thế này?



Quét QR hoặc truy cập: **diemdanh.app/tao-bai-trac-nghiem**

diemdanh.app